

## 氧化型谷胱甘肽含量测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

## 测定意义：

GSH/GSSG 是细胞内最重要的氧化还原对之一。因此，测定细胞内 GSH 和 GSSG 含量以及 GSH/GSSG 比值，能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态，也是谷胱甘肽氧化还原循环的主要指标之一。

## 测定原理：

利用 2-VP 法测 GSSG 含量。

## 组成：

产品名称	GSH003-50T/48S	Storage
试剂一：液体	50ml	4℃
试剂二：液体	300μl	4℃
试剂三：液体	50ml	4℃
试剂四：液体	6ml	4℃
试剂五：液体	30μl	-20℃
试剂六：粉剂	1 瓶	4℃
说明书	一份	

试剂五：液体 30μl×1 瓶，-20℃ 保存。临用前加入 0.6 ml 试剂三稀释，4℃ 保存。

试剂六：粉剂×1 瓶，4℃ 保存。临用前加入 40 ml 试剂三溶解，现配现用。

## 自备仪器和用品：

可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1ml 玻璃比色皿和蒸馏水。

## 粗酶液提取：

1. 组织：按照组织质量 (g)：试剂一体积(ml)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 试剂一）进行冰浴匀浆。8000g 4℃ 离心 10min，取上清液（如上清不清澈，再离心 3min）待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量 (10<sup>4</sup> 个)：试剂一体积 (ml) 为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1ml 试剂一），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；8000g 4℃ 离心 10min，取上清液（如上清不清澈，再离心 3min）的蒸馏水混匀待测。
3. 血清等液体：直接测定。

**测定操作:**

1. 分光光度计预热 30 min，调节波长到 412 nm，蒸馏水调零。
2. 试剂三置于 25℃（一般物种）或者 37℃（哺乳动物）水浴中保温 30min。
3. **测定管**：取 1 ml EP 管，加入 **100 μ L 上清液**，5μ L 试剂二，盖紧后混匀，置于 37℃水浴 30min；依次加入 100 μ L 试剂四，10 μ L 试剂五，700 μ L 试剂六，迅速混匀后，立即测定 30 s 和 150 s 光吸收 A1 和 A2，计算  $\Delta A = A2 - A1$ 。

**GSSG 含量计算公式:**

1、标准条件下测定的回归方程为  $y = 0.0276x - 0.0011$ ；x 为标准品浓度（nmol/ml），y 为吸光值( $\Delta A$ )。

2、按蛋白浓度计算

$$\text{GSSG (nmol/mg prot)} = (\Delta A + 0.0011) \div 0.0276 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr})$$
$$= 36.23 \times (\Delta A + 0.0011) \div \text{Cpr}$$

3、按样本鲜重计算

$$\text{GSSG (nmol/g 鲜重)} = (\Delta A + 0.0011) \div 0.0276 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W)$$
$$= 36.23 \times (\Delta A + 0.0011) \div W$$

4、按细胞数量计算

$$\text{GSSG (nmol/10}^4 \text{ cell)} = (\Delta A + 0.0011) \div 0.0276 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量})$$
$$= 36.23 \times (\Delta A + 0.0011) \div \text{细胞数量}$$

5、按照液体体积计算 GSSG (nmol/ml)

$$= (\Delta A + 0.0011) \div 0.0276 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样}}$$
$$= 36.23 \times (\Delta A + 0.0011)$$

V 样：反应中加入样本体积，0.1ml；V 样总：加入提取液体积，1ml；W：样品质量，g，Cpr：样本蛋白浓度（mg/ml）

**注意事项：**

1. 提取过程中去掉蛋白质，所以提取液不能用于测定蛋白含量。
2. 临用前配制的试剂配好后 4℃保存，2 天内使用完毕。
3. 最低检出限为 0.1 μmol/L。
4. 反应温度.严格来说，为保证重复性，应在 25℃下进行反应。
5. 反应时间需精确控制，否则会影响反应速率计算，产生较大误差。
6. 样品中的 GSSG 浓度尽可能低一些，否则反应速率太大，没法控制，所以稀释倍数要尽量大些。